

УТВЕРЖДЕНО
 Генеральный директор
 Общество с ограниченной ответ-
 ственностью «Санветпрепарат-Плюс»


 А.А. Кузнецов
 « 29 »  20 22 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ФУНГИЦИДНОГО «БрызнОФФ-ЭНИЛ»

(организация-разработчик: ООО «СВП+», г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная д.6А)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство фунгицидное в форме концентрата эмульсии, предназначено для проведения противогрибковой дезинфекции объектов ветеринарного надзора и находящегося в них оборудования и инвентаря для ухода за животными. Применяется в животноводческих, птицеводческих, звероводческих и прочих помещениях.

Средство обладает широким спектром фунгицидного действия в отношении многих видов грибов и их спор, включая: *Aspergillus spp.*, *Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*, *Candida albicans*, *Absidia corymbifera*, *T. Mentagrophytes*, *M. gypseum*, *T. equinum* и другие.

1.2. Средство для противогрибковой дезинфекции «БрызнОФФ-ЭНИЛ», содержит энилконазол (150 мг/см³), вспомогательные компоненты до 1см³.

1.3. Средство расфасовывают по 100 мл, по 1000 мл в полимерные флаконы.

1.4. Срок годности при соблюдении условий хранения – 4 года со дня производства. Запрещается применение средства по истечении срока годности.

1.5. Средство «БрызнОФФ-ЭНИЛ» хранят в складских помещениях в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 30°С. Перевозят средство всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.6. Средство фунгицидное «БрызнОФФ-ЭНИЛ» следует хранить в местах, недоступных для детей.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. По степени воздействия на организм средство относится ко 3 классу опасности в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007. При применении в рекомендованных концентрациях, не вызывает раздражение слизистых оболочек.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

3.1. Противогрибковую дезинфекцию рекомендуется проводить после механической очистки и мойки поверхностей, при рекомендуемой температуре в помещении не ниже 10⁰С в отсутствие животных, обслуживающего персонала, пищевых продуктов и продукции животного происхождения при обязательном предварительном оповещении всех рабочих о проводимой обработке.

Перед дезинфекцией помещение готовят: закрывают окна, двери, вытяжные люки, выключают вентиляцию.

3.2. До начала работ следует рассчитать необходимое для обработки помещения количество, которое определяют путем умножения длины помещения, на его ширину.

3.3. Необходимо тщательно перемешать (встряхнуть) необходимое количество флаконов перед применением. Приготовить рабочий раствор концентрата эмульсии (1:100). Для этого смешивают 1 литр препарата на 100 л воды, желательна нагретой до 30⁰ – 40⁰С. Для обработки применяют распыляющее устройство.

3.4. Убедиться, что в помещении не осталось людей и животных.

3.5. Время экспозиции зависит от состояния обрабатываемой поверхности и должно составлять: для гладких поверхностей от 60 минут, для шероховатых и неровных поверхностей - не менее 12 часов.

3.6. Возможно применение с другими дезинфицирующими средствами.

3.9. После обработки дезинфектор должен покинуть помещение. По возможности помещение следует оставить на период до 24 часов. По истечении времени обработки необходимо включить вентиляцию. После чего вымыть водой кормушки, поилки, прочие поверхности, с которыми соприкасаются животные.

Эффективность обработки снижается при некачественной предварительной подготовке помещений (грязь на поверхностях, мешки с кормами, стопки бумаги и картона, сено, подстилка, навоз и прочее).

3.10. Допускается проведение локальной противогрибковой обработки отдельных, свободных от животных стойл, клеток, участков поверхности, единиц оборудования и инвентаря при наличии включенной вентиляции, при отсутствии людей и животных в непосредственной близости.

Норма расхода средства:

- Инкубаторы и выводные шкафы: 10 л рабочего раствора на 750 м² или 3000 м³ каждый раз перед инкубацией, до и после сбора птенцов;
- Птичники, конюшни, животноводческие фермы, подстилка: 25 л рабочего раствора на 750 м² или 3000 м³.
- Кролиководство: 25 л рабочего раствора на 750 м² или на 3000 м³ 2 раза в неделю в течение 3 недель и более.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При работе с «БрызноФФ-ЭНИЛ» обязательными являются следующие меры безопасности:

- исключить попадание раствора или концентрата на открытые участки тела;
- применять средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, средства защиты органов дыхания, очки).

4.2. Перед началом работы со средствами дезинструктор проводит инструктаж по технике безопасности и мерам оказания первой помощи. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки – смыть большим количеством проточной воды, при случайном попадании в глаза или внутрь – немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь этикетку от препарата или инструкцию по применению).

4.3. Индивидуальные защитные средства включают: халат или комбинезон, нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием, герметические защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок), универсальные респираторы "РУ-60М", "РПГ-67" с патроном марки "А". Примерное время защиты не менее 100 часов.

4.4. После окончания работы со средствами вымыть лицо и руки с мылом; спецодежду следует вытряхнуть вне помещения и выстирать.

4.5. При работе со средством обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, раздражение органов дыхания, глаз.

5.2. При отравлении через дыхательные пути - вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой и обратиться к врачу.